

Dr.とうげの  
処方箋

生活

～9枚目～

## 切れ痔の治療

何度も繰り返すと、  
癒痕（はんこん）や  
見張りイボができ  
てきます。慢性化す  
ると薬で治療する  
ことは難しく、根治  
術が必要となりま  
す。さらに進行して  
肛門の開きが悪く  
なると、軟らかい便  
でも切れてしまう  
ため、肛門の拡張術  
が必要となります。

◎ 便が硬い時に切  
れて出血します。長  
年繰り返しています  
が大丈夫ですか？

▲ 主に硬い便によ  
り、肛門の出口付近  
の粘膜が裂けてしま  
うことがあります。  
これが切れ痔  
（裂肛：れっこう）で  
す。初期の裂肛は、  
排便習慣の見直し  
と軟膏や坐薬です  
ぐに治癒しますが、

裂肛は頻度が多く、  
軽く考えがちです  
が、ゆっくりと進行  
してくる病気で、  
痛みや出血を繰り返  
している場合は、  
慢性化する前に専



急性裂肛

慢性裂肛  
(見張りイボ、肛門ポリープ)



藤解 邦生 先生  
日本外科学会専門医  
日本消化器外科学会専門医  
日本消化器内視鏡学会専門医  
日本大腸肛門内科学会専門医

医療法人社団  
とうげ外科胃腸科

〒100-0001 東京都千代田区千代田  
HOONOH-ON-GUNDO